

DICLOFENACO

Inyectables y Gel

COMPOSICIÓN:

Cada Ampolla de 3ml contiene:

Diclofenaco Sódico 75mg

Cada 100g de Gel tiene:

Diclofenaco dietilamonio 1.16 g

PROPIEDADES:

Su mecanismo de acción se explica, en parte en la inhibición competitiva e irreversible de la biosíntesis de la prostaglandina y en parte por la inhibición de la enzima lisosómica.

El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroide, con propiedades analgésicas y antirreumáticas. El **inyectable** ofrece alivio aún más rápido e inmediato del dolor y la inflamación.

Rápido y prolongado alivio del dolor y la inflamación. **Diclofenaco Emugel** es una terapia cómoda y eficaz para los procesos inflamatorios musculoesqueléticos.

INDICACIONES:

Enfermedades reumáticas crónicas y agudas, tales como la artritis reumatoidea, osteoartritis, pelviespondilitis anquilosante, artrosis, espondiloartrosis, gota, psoriasis, lupus eritomasosodiseminado, estados dolorosos inflamatorios de origen no reumático .

Diclofenaco Emugel esta indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas y agudas, tales como artritis reumatoidea, artritis reumatoidea juvenil, osteoartritis, pelviespondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, psoriasis, lupuseritematoso diseminado, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, miositis, dermatomiotitis y artropatías de toda especie. Además, Diclofenaco Emugel es ideal para ser prescrito en casos de lumbago, ciática, traumatismos deportivos, esguinces, torceduras, luxaciones, tendinitis, bursitis, codo de tenista, postoperatorio en traumatología y cirugía, ataque agudo de gota.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo, período de lactancia: esta contraindicado en niños menores de 6 años. También en casos de úlceras gástricas, duodenales, trastornos de la función renal, hepática y hematopoyéticos. Debe tenerse especial cuidado en paciente hipersensibles a los antiinflamatorios no esteroides, especialmente en pacientes que sufren de asma, fiebre del heno, pólipos nasales e infecciones de las vías respiratorias.

INTERACCIONES:

El uso concomitante con otros AINEs y/o corticoides puede intensificar los efectos colaterales gastrointestinales. Con ácido acetilsalicílico disminuye, recíprocamente, su biodisponibilidad. Aumenta los efectos de los anticoagulantes orales, heparina e hipoglicemiantes de tipo sulfamidas. Disminuye el efecto de drogas antihipertensivas, por retención de sodio y efecto vasoconstrictor, debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Aumenta los niveles plasmáticos de litio porque interfiere en la excreción renal. No se lo debe aplicar concomitantemente con digoxina.

REACIONES ADVERSAS:

Al inicio del tratamiento pueden presentarse disturbios gastrointestinales, raras veces alergias y rash cutáneo y reacciones anafilácticas. Esporádicamente trastornos de SNC, raras veces edemas y trastornos hematopoyéticos en tratamientos largos.

Diclofenaco Emugel se tolera bien. Ocasionalmente se han observado prurito, enrojecimiento de la piel, dermatitis micocamentosa de la zona tratada. La incidencia de efectos secundarios sistémicos no puede ser excluida en los tratamientos de áreas extensas de la piel durante un periodo prolongado.

ADVERTENCIA:

Medicamento de uso delicado, manténgase fuera del alcance de los niños y úsese por prescripción médica. Debe administrarse con precaución en pacientes con úlcera péptica, colitis ulcerativa, ingiera el medicamento junto a las comidas.

Hipersensibilidad al diclofenaco o a la base del **gel**. Al ácido acetilsalicílico y demás antiinflamatorios no esteroideos. No se recomienda durante el embarazo porque no ha sido establecido su uso todavía. No utilizar vendajes oclusivos.

ALMACENAMIENTO:

Almacénese en temperatura no mayor a 30°C y en lugar seco.

PRESENTACIÓN:

Ampollas de 75mg/3ml, cajas por 1 ampolla
Gel Caja tubo de 15g, Caja tubo de 30g