

GENTADERM 0.1%
(Sulfato de Gentamicina)
Crema
Antibiótico de amplio espectro

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de crema contiene:

Sulfato de Gentamicina, equivalente a 0.100 g Gentamicina base 0.206g

PROPIEDADES:

La Gentamicina interfiere con la síntesis de proteína bacteriana por ligadura primaria con la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos. Es efectiva contra muchas cepas de Gram-negativos: Campylobacter, Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Providencia, Acinetobacter Calcoaceticus, Pseudomonas y Serratia. La CIM varía entre 0.06 a 8 mg/ml.

INDICACIONES:

Es recomendable para las infecciones primarias supurantes, exudativas y sebáceas e infecciones secundarias como el acné pustular, la dermatitis seborreica y el eccema infectado.

Es recomendable para las infecciones primarias supurantes, exudativas y sebáceas e infecciones secundarias como el acné pustular, la dermatitis seborreica y el eccema infectado. El ungüento ayuda a mantener la humedad y es particularmente útil en el tratamiento de infecciones en piel seca, eccematosa o psoriásica. El ungüento ha sido utilizado con éxito al igual en niños mayores de un año de edad como en adolescentes y adultos.

PRECAUCIONES:

El uso tópico prolongado de antibióticos puede producir crecimiento de microorganismos no susceptibles, como hongos. Si esto ocurriera o si se observara irritación o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto, descontinúese el uso de la preparación e institúyase el tratamiento apropiado.

Se ha demostrado que hay alergenicidad cruzadas entre los aminoglucósidos.

Puede producirse contaminación del ungüento y la solución si el extremo abierto del tubo toca cualquier superficie. Para evitar la contaminación o

infecciones cruzadas, no se deberá utilizar el mismo frasco por más de una persona.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Uso durante el embarazo: No se ha establecido la seguridad de su uso en mujeres gestantes.

Uso durante la lactancia: Deben tomarse precauciones como el ungüento oftálmico si se administre a mujeres en el periodo de lactancia.

CONTRAINDICACIONES:

Esta contraindicado en enfermos que presentan hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus ingredientes.

INTERACCIONES:

La administración simultánea de otros fármacos conocidos como neurotóxicos, ototóxicos o nefrotóxicos, potencializa las reacciones adversas de la gentamicina. Debe evitarse el uso de otros aminoglucósidos, anfotericina B, cisplatino, cefalotina, vancimicina y diuréticos potentes. El efecto de bloqueo neuromuscular se incrementa, con el uso concomitante de anestésicos generales y relajantes musculares periféricos.

REACIONES ADVERSAS:

Se han informado casos de irritación transitoria.

ALMACENAMIENTO:

Almacénese en temperatura no mayor a 30°C y en lugar seco.

PRESENTACIÓN:

Caja x 1 tubo de 20g de Sulfato de Gentamicina