

METMIDA
(Metformina)
Comprimido Recubierto
Antidiabético oral

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido recubierto contiene:
500mg de Metformina Clorhidrato

ACCIÓN:

Tiene acción antidiabética al favorecer la utilización periférica de la glucosa sin poseer ninguna actividad directa sobre las células beta pancreática. La presencia de insulina de ambos tipos, exógena y endógena, aún en cantidades bajas, es un requisito para su acción. Más aún la METFORMINA reduce la gluconeogénesis y la absorción intestinal de la glucosa.

La METFORMINA disminuye el peso del cuerpo, mejora el perfil de lípidos.

La METFORMINA reduce los riesgos de acidosis láctica. Con METFORMINA son muy raros los riesgos de episodios hipoglicémicos.

INDICACIONES:

Diabetes tipo 2 sin tendencia a la cetoacidosis.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la metformina. Diabetes tipo 1, diabetes cetoacidótica, pacientes diabéticos con historial de acidosis láctica, coma o precoma diabético.

Embarazo y lactancia. No se recomienda el uso de METFORMINA en niños.

REACCIONES INDESEABLES:

Pueden producirse ataques hipoglucémicos, especialmente en ancianos. El uso de las biguanidas puede dar origen a algunos inconvenientes, particularmente estados de acidosis láctica, que son poco frecuentes pero que usualmente tienen consecuencias serias.

ALMACENAMIENTO:

Almacénese en temperatura no mayor a 30°C y en lugar seco.

PRESENTACIÓN:

- **Tabletas** de 500 mg. cajas por 100 tabletas recubiertas.